Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Santé Québec,
Robert Courtemanche, Lorraine Caouette, marcel Godbout et France Lapointe,
Bureau de la statistique du Québec.

(1995)

“Méthodes”

Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi

Courriel : jean-marie_tremblay@uqac.ca

Site web pédagogique : <http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/>

Dans le cadre de : "Les classiques des sciences sociales"

Une bibliothèque numérique fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi

Site web : <http://classiques.uqac.ca/>

Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi

Site web : <http://bibliotheque.uqac.ca/>

Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi à partir de :

Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, (Santé Québec),
Robert Courtemanche, Lorraine Caouette, marcel Godbout et France Lapointe, (Bureau de la statistique du Québec).

"Méthodes".

Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Lucie Chénard et Madeleine Levasseur, **Santé Québec. Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'Enquête sociale et de santé 1992-1993. Volume 1.** Chapitre 1, pp. 1-11. Québec : Santé Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec, novembre 1995, 412 pp.

[Au nom de l'Éditeur du Québec, Publications Québec, Mme Cynthia Lachance, responsable de la gestion des droits d'auteur, nous a donné le 17 octobre 2006 la permission de diffuser ce livre, en texte intégral, dans Les Classiques des sciences sociales.]

Courriel : cynthia.lachance@mrci.gouv.qc.ca

Polices de caractères utilisée :

Pour le texte : Times New Roman, 14 points.

Pour les citations : Times New Roman, 12 points.

Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.

Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2004 pour Macintosh.

Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter), 8.5'' x 11''

Édition numérique réalisée le 7 août 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada.

Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Santé Québec,
Robert Courtemanche, Lorraine Caouette, marcel Godbout et France Lapointe,
Bureau de la statistique du Québec.

“MÉTHODES”.

Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Lucie Chénard et Madeleine Levasseur, **Santé Québec. Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l’Enquête sociale et de santé 1992-1993. Volume 1**. Chapitre 1, pp. 1-11. Québec : Santé Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec, novembre 1995, 412 pp.

Table des matières

- 1.0 [Introduction](#)
- 1.1 [Procédures d'enquête](#)
  - 1.1.1 [Instruments de collecte des données](#)
  - 1.1.2. [Plan de sondage](#)
  - 1.1.3 [Collecte des données](#)
  - 1.1.4 [Taille de l'échantillon et non-réponse](#)
- 1.2 [Traitement des données](#)
  - 1.2.1 [Validation](#)
  - 1.2.2 [Pondération](#)
  - 1.2.3 [Méthodes d'analyse](#)
- 1.3 [Présentation des résultats](#)
- 1.4 [Limites de l'enquête](#)
- 1.5 [Références bibliographiques](#)

Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Santé Québec,
Robert Courtemanche, Lorraine Caouette, marcel Godbout et France Lapointe,
Bureau de la statistique du Québec.

“MÉTHODES”.

Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Lucie Chénard et Madeleine Levasseur, **Santé Québec. Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l’Enquête sociale et de santé 1992-1993. Volume 1**. Chapitre 1, pp. 1-11. Québec : Santé Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec, novembre 1995, 412 pp.

1.0 Introduction

[Retour à la table des matières](#)

Ce premier chapitre traite des grandes lignes des différents aspects méthodologiques reliés à l'Enquête sociale et de santé 1992-1993. Sont d'abord présentées les procédures d'enquête, sous l'angle des instruments utilisés, du plan de sondage et de la méthode de collecte des données, ainsi que les caractéristiques de l'échantillon qui en résulte. On y décrit ensuite brièvement les étapes de validation et de pondération des données recueillies, de même que les méthodes d'analyse retenues pour ce rapport. Les normes de présentation des résultats sont également précisées et le chapitre se termine par un rappel de la portée et des limites inhérentes à ce type d'enquête.

1.1 Procédures d'enquête

1.1.1 Instruments de collecte des données

[Retour à la table des matières](#)

Les instruments de l'enquête ont été élaborés par Santé Québec avec la collaboration de nombreux experts du milieu de la santé et des services sociaux. Les trois outils principaux de l'enquête Santé Québec 1987, soit la fiche d'identification, le questionnaire rempli par l'interviewer et le questionnaire autoadministré, ont été repris et adaptés aux objectifs de l'Enquête sociale et de santé. En général, on a conservé le libelle exact des questions afin d'assurer la comparabilité des données entre les deux enquêtes. De nouvelles questions ont également été proposées à l'occasion par les groupes d'analyse ; dans ce cas, les questions déjà validées ou provenant d'autres enquêtes populationnelles ont été privilégiées, sinon, Santé Québec a fait appel à des experts qui en ont élaboré de nouvelles. Les questions soumises ont ensuite été approuvées par le comité d'orientation de l'enquête.

La fiche d'identification, remplie par l'interviewer, contient des renseignements administratifs et permet d'établir la liste des membres du ménage et leurs caractéristiques d'âge, de sexe et de lien de parenté aux fins de l'entrevue.

Le questionnaire du ménage rempli par l'interviewer (QRI) vise à recueillir des renseignements portant sur chacun des membres de la maisonnée auprès d'un informateur clé. Ses principaux thèmes sont l'incapacité et la limitation des activités, le recours aux services sociaux ou de santé, la consommation de médicaments, les accidents et blessures ainsi que des renseignements démographiques et socio-

économiques. Toute la section portant sur les problèmes de santé, présente dans le questionnaire de 1987, a été retranchée parce que ce type d'indicateurs varie peu sur une courte période.

Le questionnaire autoadministré (QAA), destiné aux personnes de 15 ans et plus du ménage, comporte des questions sur la perception de la santé, les habitudes de vie, certains comportements de santé propres aux femmes, le milieu social, divers problèmes liés à la santé mentale, et des renseignements socio-démographiques. De nouvelles sections portant sur l'autonomie décisionnelle au travail et sur les aidants naturels ont été ajoutées.

Des questionnaires autoadministrés portant sur la résolution des conflits intrafamiliaux ont été élaborés et présentés à un sous-échantillon lors de la visite de l'interviewer. Une description détaillée de cette procédure et du contenu de ce volet est faite dans la monographie sur le sujet, publiée séparément.

Chaque questionnaire est disponible en français et en anglais, en fonction des besoins des répondants. Le présent rapport ne comporte pas d'exemplaires des questionnaires, que l'on peut toutefois se procurer en en faisant la demande à Santé Québec.

1.1.2 Plan de sondage

[Retour à la table des matières](#)

La population visée par l'Enquête sociale et de santé 1992-1993 est l'ensemble des ménages privés de toutes les régions socio-sanitaires du Québec à l'exclusion des régions crie et inuite, qui ont fait l'objet d'enquêtes distinctes, et des réserves indiennes. Les personnes vivant dans des ménages collectifs tels que les centres d'accueil et les hôpitaux sont exclues de la population visée. Celle-ci représente 97,5% de l'ensemble de la population québécoise.

L'ensemble du territoire où vit cette population a été découpé en petites aires géographiques appelées unités primaires d'échantillonnage (UPE). Elles correspondent généralement à des secteurs de dénombrement du recensement canadien de la population de 1986. L'ensemble de ces unités forme la base de sondage.

Avant la sélection de l'échantillon, les UPE ont été regroupées en strates. Chaque strate est formée du croisement d'une région socio-sanitaire et d'une aire homogène. On dénombre douze aires homogènes, que l'on obtient en découpant d'abord le Québec en quatre zones distinctes, soit la région métropolitaine de Montréal (M), les capitales régionales (C), les agglomérations et villes (A), et le monde rural (R). Chaque zone est ensuite subdivisée en trois aires en fonction de conditions socio-économiques : une aire vulnérable (1), une aire intermédiaire (2) et une aire peu vulnérable (3). La définition des aires homogènes est similaire à celle de « La santé à la carte » (Pampalon et al., 1990) ; les données de base sur les caractéristiques socio-économiques ont toutefois été mises à jour à l'aide des données du recensement de 1986, et une méthode statistique de classification a été utilisée pour déterminer les seuils de vulnérabilité. Un des cahiers techniques de l'enquête précise la définition des aires homogènes ¹.

La taille totale de l'échantillon et sa répartition par strate ont été obtenues à partir des critères suivants :

- des échantillons régionaux de 800 logements minimum pour permettre des analyses régionales ;
- des échantillons plus considérables pour les régions plus peuplées de Montréal-Centre et de la Montérégie, pour augmenter la précision des estimations nationales ;

---

¹ Le lecteur intéressé à la description des aires et aux résultats qui s'y rapportent peut également consulter le Volume 3 du présent rapport, qui analyse les données de l'enquête en fonction des aires homogènes.

- des échantillons infrarégionaux (au moins deux par région) permettant de détecter des différences importantes (d'environ 4%) avec une puissance de 80% et une erreur de premier type de 5% ;
- des échantillons totaux d'au moins 800 logements pour l'ensemble des aires vulnérables de la zone des capitales régionales, de la zone des agglomérations et villes et de celle du monde rural, qui permettent des analyses provinciales selon ces aires ;
- un échantillon d'une taille minimale de 1200 logements pour l'ensemble de l'aire vulnérable de la zone métropole, qui permet des analyses selon cette aire ;
- des unités supplémentaires permettant de répondre à des objectifs définis par les régions elles-mêmes.

À l'aide de ces critères, la taille totale de l'échantillon a été déterminée à 16 010 logements. Leur répartition par strates est présentée au tableau 1.1. Le rapport entre le nombre de logements échantillonnés et le nombre de logements dans la population varie d'une région à l'autre : il passe de 0,32% pour la région de Montréal à 3,30% pour la Côte-Nord. Ce rapport est aussi plus important dans les aires vulnérables que dans les deux autres aires, quelle que soit la zone.

De plus, l'échantillon total a été réparti entre quatre périodes de collecte disjointes qui s'étaient sur une année. Pour chaque vague, la taille de l'échantillon par strate est similaire.

À l'intérieur de chaque strate, l'échantillon a été sélectionné en deux étapes. Premièrement, un échantillon aléatoire d'UPE a été sélectionné avec une probabilité proportionnelle au nombre de ménages recensés en 1986. Dans chaque UPE choisie, un échantillon systématique de logements a été tiré à partir d'un point de départ aléatoire.

Toutes les personnes résidant dans les logements sélectionnés sont visées par l'enquête. Au total, 1 139 UPE ont été sélectionnées comportant chacune un échantillon de 10, 20 ou 30 logements, selon la zone.

L'Enquête sociale et de santé a donc un plan de sondage stratifié par région et par aires homogènes. L'échantillon des logements par strate est réparti de façon non proportionnelle, avec sélection à deux degrés. Ce plan de sondage a été élaboré par le Bureau de la statistique du Québec.

Tableau 1.1

Répartition de l'échantillon des ménages selon la région et l'aire homogène,
Enquête sociale et de santé 1992-1993

[Retour à la table des matières](#)

Régions	Aires homogènes												
	M1	M2	M3	C1	C2	C3	A1	A2	A3	R1	R2	R3	Total
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	60	360	60	140	200	0	820
Saguenay-Lac-St-Jean	0	0	0	260	200	0	40	140	20	100	80	0	840
Québec	0	0	0	360	440	200	40	140	0	40	140	0	1360
Mauricie-Bois-Francis	0	0	0	120	260	0	100	220	80	40	220	80	1120
Estrie	0	0	0	40	260	120	60	260	40	40	160	120	1100
Montréal-Centre	980	1100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2280
Outaouais	0	0	0	60	360	220	0	100	0	60	160	40	1000
Abitibi-Témiscamingue	0	0	0	0	0	0	60	360	120	90	210	30	870
Côte-Nord	0	0	0	0	0	0	90	420	150	180	90	60	990
Gaspésie-Les-Îles	0	0	0	0	0	0	150	180	30	150	240	60	810
Chaudière-Appalaches	0	0	0	40	220	0	40	160	40	40	200	100	840
Laval	40	540	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Lanaudière	0	280	60	0	0	0	40	120	40	40	240	80	900
Laurentides	40	260	60	0	0	0	40	160	40	60	240	60	960
Montérégie	140	440	140	0	0	0	100	220	100	0	80	100	1320
Total	1200	2620	680	880	1740	540	820	2 840	720	980	2260	730	16 010

0 Sans objet

— Représente des regroupements d'aires formant les échantillons infrarégionaux.

1.1.3 Collecte des données

[Retour à la table des matières](#)

La collecte des données s'est déroulée de novembre 1992 à novembre 1993, afin de tenir compte du caractère saisonnier des problèmes de santé et de certains comportements. Une période d'énumération des logements des UPE échantillonnées précédait chaque vague de collecte. Cette tâche incombait à l'interviewer et consistait à établir une liste exhaustive des logements présents dans l'UPE au moment de l'enquête. En plus d'une vérification du travail par le Bureau de la statistique du Québec, l'énumération était systématiquement reprise par un autre énumérateur pour 10% des UPE, afin de s'assurer de la qualité du travail effectué. À partir de cette liste validée de logements, le BSQ sélectionnait les ménages.

Dans chacun de ces ménages, une entrevue avec un répondant principal de 18 ans et plus a été effectuée par un interviewer ; un montant de 15\$ était remis à chaque informateur clé des ménages répondants. Les personnes de 15 ans et plus étaient en outre invitées à répondre à un questionnaire autoadministré. Selon leur disponibilité, elles pouvaient s'acquitter de cette tâche pendant la visite de l'interviewer, sinon celui-ci retournait au domicile au cours des jours suivants pour récupérer les questionnaires remplis, ou alors ces derniers étaient retournés par la poste dans une enveloppe affranchie. Dans tous les cas, le questionnaire était placé dans une enveloppe cachetée avant d'être remise à l'interviewer, ou mise à la poste.

Lorsqu'aucun membre du ménage sélectionné n'était présent, l'interviewer devait tenter, au moins à six reprises, d'établir le contact en prenant soin de varier l'heure et le jour de ses tentatives. Les ménages pour lesquels aucun adulte ne pouvait s'exprimer en français ou en

anglais étaient exclus de l'échantillon tout comme, pour le QAA, les individus de 15 ans et plus ne sachant lire aucune des deux langues ².

La gestion de la collecte des données a été confiée au Groupe Léger & Léger Inc., par suite d'un appel d'offres ; Santé Québec a toutefois été associée étroitement à chacune des étapes de réalisation de la collecte et a assuré un contrôle régulier des activités. La firme de sondage a mis en place une équipe centrale de gestion, secondée par des coordonnatrices régionales qui devaient assurer la bonne marche de l'enquête dans leurs régions respectives. Ces coordonnatrices ont participé au recrutement et à la sélection des interviewers de leur région, soit un total de 125 interviewers pour l'ensemble du Québec.

Les coordonnatrices régionales ont participé à deux séances intensives de formation, l'une sur l'énumération et l'autre sur les objectifs de l'enquête, ses modalités, les instruments utilisés, les techniques d'entrevue et leur rôle de coordination. Elles étaient ensuite chargées de la formation des interviewers de leur région ; les responsables du projet pour la firme de sondages étaient aussi présents en région de même que des représentants de Santé Québec.

À la fin de chaque période de collecte, des réunions regroupant l'équipe de gestion du Groupe Léger & Léger Inc., Santé Québec, le Bureau de la statistique du Québec et les coordonnatrices permettaient de faire le point sur le déroulement de l'enquête et d'apporter les ajustements nécessaires.

Avant la collecte des données, un prétest a été effectué en juillet 1992 pour vérifier le déroulement des diverses procédures prévues et déterminer les dernières corrections devant être apportées aux instruments de l'enquête. Ce prétest a eu lieu auprès de 150 ménages, dont 50 ménages anglophones, en provenance des régions de Laval et de la

---

² Au total, 52 ménages et 106 personnes de 15 ans et plus n'ont pas été interviewés pour cette raison.

Montréal de même que de différents quartiers de la région de Montréal-Centre.

1.1.4 Taille de l'échantillon et non-réponse

[Retour à la table des matières](#)

Au total, 16 124 logements ont été sélectionnés, soit les 16 010 logements de départ auxquels se sont ajoutés 114 logements, que l'on a découverts au moment de la collecte lorsqu'il s'avérait y avoir plus d'un logement à l'adresse sélectionnée. Parmi les 16 124 logements de l'échantillon initial, 1 232 n'étaient pas admissibles à l'enquête, principalement parce qu'il s'agissait de logements saisonniers ou de logements vacants au moment de l'enquête (864 ménages). Des 14 892 ménages admissibles, 13 266 ont répondu au questionnaire rempli par l'interviewer (QRI) : ces ménages représentent au total 34 848 individus de tous âges. De ce nombre, 27 310 personnes de 15 ans et plus étaient admissibles au questionnaire autoadministré (QAA), et 23 564 individus y ont répondu.

Le taux de réponse est défini comme étant le rapport entre le nombre d'unités répondantes et le nombre d'unités admissibles à l'enquête. Dans la présente enquête, comme toutes les unités n'ont pas la même probabilité d'être choisies, il faut utiliser un taux de réponse établi sur la base de données pondérées par l'inverse de cette probabilité.

Pour le QRI, le taux de réponse global est établi sur la base des ménages admissibles et s'élève à 87,2%. La principale explication de la non-réponse au QRI demeure le refus du ménage (65% des non-répondants), tandis que 25% est due au fait qu'il n'y avait personne à la maison, bien que plusieurs tentatives aient été faites pour joindre le ménage.

Les personnes admissibles au QAA ont répondu dans une proportion de 85% ; cependant, le taux de réponse au QAA doit tenir compte du fait que les questionnaires sont administrés en cascade et correspond plutôt au produit des taux de réponse au QRI et au QAA ; le taux ainsi calculé est de 74,1%, ce qui est légèrement supérieur au taux de 1987. Le taux de non-réponse globale est plus élevé chez les personnes de 15-24 ans et de 65 ans et plus ; les hommes sont également davantage représentés parmi les non-répondants. Sur le plan régional, on enregistre à Montréal, à Québec, en Gaspésie et sur la Côte-Nord des taux de réponse au QAA plus faibles que celui de l'échantillon provincial des 15 ans et plus.

En plus de la non-réponse globale, il faut tenir compte dans les estimations de la non-réponse des répondants à des questions particulières ; on parle alors de taux de non-réponse partielle, défini comme étant le rapport entre le nombre pondéré de répondants à une question donnée et le nombre pondéré de personnes devant y répondre. Les taux de non-réponse partielle sont généralement faibles au QRI, étant donné la présence de l'interviewer, sauf pour l'indice sur le niveau de revenu, où la proportion élevée (29%) de valeurs précises manquantes a justifié un processus d'imputation ³.

Par contre, le QAA est plus susceptible de présenter des difficultés sur le plan de la non-réponse partielle ; celle-ci est généralement inférieure à 5%, mais peut parfois atteindre des seuils critiques. Une analyse générale de la non-réponse partielle au QAA a donc été faite à l'aide d'un indice synthétique formé de 14 questions ; les résultats indiquent que 85,5% des répondants avaient répondu à chacune de ces questions, ce qui révèle que dans l'ensemble, le QAA a été bien rempli ⁴. Néanmoins, certaines constances se retrouvent dans les caracté-

³ Voir le cahier technique de l'enquête pour plus de détails sur le processus d'imputation.

⁴ Voir le cahier technique de l'enquête pour plus de détails sur l'analyse de la non-réponse partielle au QAA.

ristiques des non-répondants. Ceux-ci sont en effet généralement moins scolarisés, et l'on compte une proportion plus élevée de femmes et de personnes de 45 ans et plus ; le groupe d'âge des 65 ans et plus est particulièrement touché par ce phénomène, peu importe le niveau de scolarité. Les analyses subséquentes de ce rapport font état des variables pour lesquelles le taux de non-réponse partielle est supérieur à 5%, et évaluent l'effet éventuel de cette non-réponse sur les résultats.

1.2 Traitement des données

1.2.1 Validation

[Retour à la table des matières](#)

Les questionnaires remplis par l'interviewer étaient révisés dans un premier temps par la coordonnatrice régionale ; il ne pouvait en être de même pour les QAA, puisque ceux-ci lui étaient remis sous enveloppe scellée. Les questionnaires étaient ensuite acheminés à l'équipe centrale du Groupe Léger & Léger Inc., qui procédait à une nouvelle vérification. De plus, un minimum de 10% des ménages de chaque interviewer faisaient l'objet d'une entrevue de contrôle, par téléphone. Santé Québec a aussi exercé de nombreux contrôles auprès de la firme et vérifié un grand nombre de questionnaires tant à leur arrivée qu'après leur codification.

La codification était assumée par la firme de sondage, qui a affecté une équipe de codeurs distincte à chaque instrument ; la codification des médicaments était assurée par une pharmacienne et les problèmes de santé, par une archiviste médicale. Les cas litigieux étaient discutés et réglés avec les responsables de Santé Québec. Les questionnaires faisaient ensuite l'objet d'une double saisie informatique.

La validation de la banque de données s'est faite en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la firme de sondages a effectué certaines vérifications lors de la codification et de la saisie concernant les codes admissibles et les filtres. Par ailleurs, Santé Québec s'est chargé des validations logiques et de la concordance entre les divers instruments, en plus de la vérification globale des validations dont la firme de sondages était responsable.

Le cahier technique de l'enquête rend compte de façon exhaustive des activités de validation et de traitement des données.

1.2.2 Pondération

[Retour à la table des matières](#)

La pondération consiste à attribuer à chaque répondant une valeur (un poids) qui correspond au nombre de personnes qu'il « représente » dans la population, pour chacun des instruments de l'enquête. Chaque répondant se voit donc attribuer des facteurs de pondération différents au QRI et au QAA.

Dans le cas de l'Enquête sociale et de santé, le calcul du poids du répondant à un questionnaire s'est déroulé en quatre étapes. Dans un premier temps, un poids initial a été établi pour tenir compte de la non-proportionnalité de l'échantillon par rapport à la population étudiée : ce poids est défini comme étant l'inverse de la probabilité de sélection du ménage. Ce poids initial a ensuite été ajusté pour tenir compte de la non-réponse globale au questionnaire ; pour le QRI, cet ajustement s'est effectué au niveau de l'UPE ou d'un regroupement d'UPE selon les régions, tandis que pour le QAA, les classes d'ajustement ont été définies en tenant compte de la région, du groupe d'âge, du sexe et du fait de consommer ou non des médicaments sur avis d'un médecin. D'autre part, compte tenu de la grande variabilité des poids obtenus, la valeur de certains poids extrêmes a été réduite après

l'analyse de la distribution des poids selon la région et les aires homogènes. Finalement, une poststratification a été effectuée pour s'assurer que la distribution des répondants selon l'âge, le sexe et la région était conforme à celle de la population visée par l'enquête ; les données utilisées pour cet ajustement proviennent du recensement canadien de 1991 portant sur la population vivant en ménage privé, à partir desquelles le Bureau de la statistique du Québec a fait une projection pour l'année 1993, en tenant compte du sous-dénombrement au recensement ⁵.

1.2.3 Méthodes d'analyse

[Retour à la table des matières](#)

À l'instar des autres enquêtes de Santé Québec, la présente enquête a sollicité la participation de nombreux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et des universités. Des groupes d'analyse, composés de 3 à 5 personnes choisies pour leur expertise et leur intérêt pour un sujet traité dans l'enquête, ont été mis, sur pied. Ils ont participé à la conception des questionnaires, proposé des plans d'analyse des données portant sur leur thème et formulé des demandes de tableaux. Ces extraits ont été produits par Santé Québec et analysés subséquemment par les groupes d'analyse. C'est cependant le Bureau de la statistique du Québec qui a déterminé les méthodes d'analyse statistique à utiliser dans ce rapport.

L'analyse est essentiellement descriptive. Cette orientation a été retenue pour rendre les résultats accessibles le plus rapidement possible aux planificateurs, décideurs et chercheurs. Aux fins de la présente analyse, les données ne sont pas standardisées selon le sexe et l'âge ; cependant, lors des comparaisons des résultats avec ceux de l'enquête

---

⁵ Direction des statistiques socio-démographiques, scénario préliminaire non publié, janvier 1994.

Santé Québec 1987, des sous-groupes du même âge et du même sexe sont comparés, ce qui permet de contrôler, le cas échéant, l'effet confondant de ces variables.

La complexité du plan de sondage influence grandement la précision des résultats, et l'estimation de la précision de chaque proportion est nécessaire à l'inférence. L'effet de plan mesure la perte ou le gain de précision attribuable au plan de sondage par rapport à la précision qu'on aurait eue si l'on avait tiré un échantillon aléatoire simple, de même taille. Étant donné le très grand nombre de tableaux produits, la précision tenant compte de l'effet de plan ne pouvait être calculée pour chacune des estimations. Des effets de plan médians ont plutôt été produits pour six groupes de caractéristiques, dont la variance est homogène. L'effet de plan médian principal qui s'applique à la majorité des phénomènes étudiés s'élève à 2,3 pour le QRI et à 2,2 pour le QAA. Pour les mesures davantage liées aux ménages, on pouvait obtenir des effets de plan plus élevés. Ces effets de plan ont été utilisés lors de l'analyse.

Le coefficient de variation (CV) permet de mesurer la précision d'une estimation. On l'obtient en divisant l'erreur-type de la proportion estimée par la proportion elle-même. Parce qu'elles sont suffisamment précises, les proportions dont le CV est inférieur à 15% sont présentées sans commentaire ; celles dont le CV se situe entre 15% et 25% sont marquées d'un astérisque (*), pour montrer que l'estimation doit être interprétée avec prudence. Les proportions dont le CV est supérieur à 25% sont marquées d'un double astérisque (**), pour en signaler l'imprécision, et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les coefficients de variation n'ont pas été calculés pour les données de 1987, mais devraient être généralement du même ordre de grandeur que ceux de 1992-1993, si l'on considère que les tailles d'échantillon sont équivalentes pour les deux enquêtes.

Toute relation entre deux variables a d'abord été mesurée par le test chi carré. Un ajustement a toutefois été effectué pour tenir compte du

plan de sondage. Cela consistait à diviser la statistique par l'effet de plan médian correspondant à la variable d'analyse dans un tableau donne. Le seuil de signification statistique a été fixé à 1% pour tous les tests. Les tableaux ont été produits par Santé Québec à l'aide du logiciel SAS. Si un test plus exact s'avérait nécessaire, il était effectué par le Bureau de la statistique du Québec, à l'aide du logiciel SUDAAN ; on utilisait alors la correction de Satterthwaite pour le test chi carré (Rao et Scott, 1981).

Finalement, les tests d'égalité de deux proportions étaient d'abord effectués à partir de deux intervalles de confiance, un pour chaque paramètre concerné. La règle de décision s'articulait alors autour de l'absence de chevauchement entre ces intervalles. Lorsque des différences semblaient importantes, sans avoir été déclarées significatives par cette méthode, le BSQ établissait la comparaison en mesurant la précision associée aux proportions à l'étude.

Les intervalles de confiance ne sont toutefois pas indiqués dans ce rapport ; le coefficient de variation a plutôt été choisi pour indiquer la précision des estimations. Le lecteur intéressé à calculer des intervalles de confiance pour des proportions tirées de cette enquête pourra toutefois utiliser des grilles conçues spécialement à cette fin et présentées en annexe. Il faut cependant noter que ces grilles ne s'appliquent qu'aux paramètres provinciaux.

1.3 Présentation des résultats

[Retour à la table des matières](#)

Les pourcentages ont été arrondis à l'unité quand ils sont mentionnés dans le texte et à une décimale, dans les tableaux. En raison de l'arrondissement des proportions, la somme des proportions de certains tableaux peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100%.

En général, seules les différences significatives au seuil de 1% sont mentionnées dans le texte. Certaines différences non significatives peuvent à l'occasion être signalées si elles présentent un intérêt en matière de santé ; elles sont alors exprimées sous le terme de « tendances ». Il peut arriver que deux proportions qui semblent différentes ne le soient pas d'un point de vue statistique, à cause notamment du petit nombre d'individus sur lequel est basée l'estimation.

Quand des comparaisons sont effectuées entre les résultats de 1992-1993 et ceux de 1987 à partir d'un indice synthétique différent de celui qui a été publié dans le rapport de 1987, l'indice a été reproduit avec les données de 1987, selon les caractéristiques de l'indice de 1992-1993 ⁶. De plus, les données de 1987 ont été révisées à l'aide d'une poststratification qui tient compte non seulement de l'âge et du sexe, mais aussi de la région, comme cela a été fait pour la présente enquête, de sorte que les résultats publiés dans ce document peuvent différer de ceux du rapport de l'enquête Santé Québec 1987.

De nombreux tableaux précisent les effectifs de population correspondant aux résultats présentés. Ces effectifs peuvent correspondre directement au numérateur d'une proportion estimée et représenter le

---

⁶ Les utilisateurs de la banque de données qui voudraient comparer 1987 et 1992-1993 devraient se procurer la banque de 1987 remaniée à cet effet.

nombre d'individus touchés par le phénomène dans la population : l'abréviation « Pe » est alors inscrite, pour « population estimée ». D'autres tableaux présentent plutôt le nombre d'individus dans la population à qui s'adresse la question (N).

1.4 Limites de l'enquête

[Retour à la table des matières](#)

L'Enquête sociale et de santé n'est pas à l'abri des limites propres à ce type d'enquête. Ainsi, malgré toutes les précautions prises pour assurer la qualité des données et minimiser les biais, il est impossible de garantir l'exactitude des réponses fournies par les répondants. Les personnes interrogées peuvent être influencées, entre autres, par le phénomène de la désirabilité sociale, par la difficulté de se rappeler des événements passés ou d'évaluer le temps écoulé depuis un événement. Les renseignements portant sur les membres du ménage peuvent manquer de précision quand ils proviennent d'une tierce personne.

Une enquête transversale comme l'Enquête sociale et de santé permet de déceler des liens entre deux variables ainsi que des différences entre des sous-groupes de la population ou avec l'enquête Santé Québec 1987. Elle ne permet toutefois d'établir aucun lien de causalité entre les variables.

Il faut aussi interpréter avec prudence les résultats présentés dans ce rapport. Le recours à des analyses bivariées pour documenter les thèmes abordés par l'enquête ne permet pas le contrôle de facteurs exogènes qu'auraient rendu possible la standardisation ou l'analyse multivariée. Elles présentent néanmoins l'avantage de permettre une bonne description des données recueillies.

Cette enquête fait abstraction de quelque 2% de la population vivant dans des logements collectifs, notamment des établissements de santé. Comme ces personnes présentent généralement un bilan plus lourd sur le plan socio-sanitaire, il faut se garder d'appliquer les résultats de l'enquête à leur égard. Cette particularité de l'échantillon, fréquente dans ce genre d'enquêtes, peut sous-estimer légèrement la prévalence de certains problèmes de santé.

Il faut cependant souligner l'attention toute particulière qui a été prêtée aux procédures inférentielles utilisées dans l'Enquête sociale et de santé, afin que les résultats puissent être généralisés à l'ensemble de la population.

1.5 Références bibliographiques

[Retour à la table des matières](#)

BELLEROSÉ, C. (1992). *Manuel de référence à l'intention des intervieweur(e)s. Enquête sociale et de santé 1992-1993*, Santé Québec, Montréal.

CAOINETTE, L. ; COURTETMANCHE, R. ; GODBOUT, M. ; LAPOINTE, F. (1994). *Enquête sociale et de santé 1992-1993. Méthodes statistiques*, Bureau de la statistique du Québec, Québec.

CAOINETTE, L. ; LAPOINTE, F. (1994). *Enquête sociale et de santé 1992-1993. Outils d'analyse*, Bureau de la statistique du Québec, Québec.

COURTETMANCHE, R. ; JEAN, L. (1992). *Énumération des logements d'une unité primaire d'échantillonnage (UPE) de l'Enquête sociale et de santé. Instructions aux énumérateurs et aux coordonnateurs*, Bureau de la statistique du Québec, Québec.

PAMPALON, R. ; GAUTHIER, D. ; RAYMOND, G. ; BEAUDRY, D. (1990). *La santé à la carte*, Les Publications du Québec, Gouvernement du Québec, Québec.

RAO, J.N.K. ; SCOTT, A.J. (1981). "The analysis of categorical data from complex sample surveys : chisquared tests for goodness of fit and independence in two-way tables", *Journal of the American Statistical Association*, vol. 76, no 374, pp 221-230.

SANTÉ QUÉBEC (1992). *Rôle et fonctions des coordonnatrices régionales. Enquête sociale et de santé 1992-1993*, Montréal.

SANTÉ QUÉBEC (1992). *Guide de formation à l'énumération à l'intention des coordonnatrices. Enquête sociale et de santé 1992-1993*, Montréal.

SHAH, B.V. ; BARNWELL, B.G. ; HUNT, P.N. ; LAVANGE, L.M. (1992). *SUDAAN Version 6.0 : Professional Software for Survey Data Analysis for Multi-stage Sample Designs*, Research Triangle Institute, Caroline du Nord.

Fin du texte